



Datos del paciente:

✓ Nombre y apellido: _____ ✓ Edad: _____

✓ Diagnóstico: _____ ✓ DNI: _____



Descripción del producto:

✓ Medicamento y/o insumo (DCI): _____ ✓ Cantidad: _____

✓ Concentración (% y mg/ml): _____

✓ Indicaciones: _____

ANDEN



Médico tratante:

NATURALS

✓ Nombre y apellido: _____

✓ Lugar de trabajo/teléfono: _____

✓ N° CMP: _____

Fecha

Sello y firma

Recordatorios:

- ✓ Por favor complete todos los campos del recetario para asegurar una prescripción segura y responsable.
- ✓ Los productos derivados de cannabis con fines terapéuticos con menos de 1% THC tienen el siguiente DCI: "Extracto Estandarizado de Cannabidiol (CBD/ THC) Cannabis Sativa"
- ✓ No olvidar colocar la concentración en porcentaje (%) así como en mg/ml en la receta. Por ejemplo: CBD 10%, THC <1% / cannabidiol 100mg/ml
- ✓ No olvidar el número de frascos recetados así como la cantidad de mL que tiene cada frasco.
- ✓ Por favor de ser el caso que el lugar de trabajo sea un consultorio particular colocar un número de contacto.
- ✓ Por favor como parte de las indicaciones incluya también el tiempo de tratamiento.



@AndenPeru



@AndenPeru



@AndenPeru



@AndenNaturals



ANDEN
NATURALS



RECETA MÉDICA

Autorizado por: Anden Naturals





ANDEN NATURALS ENDO 50

Extracto de Cannabis sativa L.
(CBD 50mg/mL)

Composición

1mL de solución oral contiene:

- Extracto de Cannabis sativa L.1g
(equivale a 50mg de Cannabidiol (CBD) y < 2mg de Delta -9- tetrahidrocannabinol (D9-THC))
- Aceite de triglicéridos de cadena media c.s.p.....1mL

Uso

Uso recomendado: coadyuvante al tratamiento de las convulsiones asociadas a epilepsia refractaria.

Dosis y vía de administración

Administrar la dosis indicada por el médico, mediante la vía sublingual.

Contraindicaciones

No debe ser usado por:

1. Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia;
2. Niños menores de 2 años de edad;
3. Mujeres en edad fértil que no usan anticonceptivos;
4. Personas con alergia a los cannabinoides conocida o sospechada;
5. Personas con enfermedad cardiovascular grave, por ejemplo insuficiencia cardíaca congestiva, con presión arterial alta mal controlada;
6. Personas con sospecha de antecedentes o antecedentes familiares de enfermedad psicótica, trastorno o trastorno severo de la personalidad;
7. Enfermedad renal
8. Enfermedad hepática

Advertencias y precauciones

No use este medicamento si usted cumple con alguna de las condiciones arriba señaladas.

Si no está seguro de comenzar este producto, converse con su médico.

Se sugiere realizarse análisis de sangre para evaluar los niveles de transaminasas y bilirrubina, antes y durante el tratamiento.

No exceda la dosis indicada por el médico.

No se sugiere el uso del producto en pacientes con antecedentes de abuso de sustancias.

La interrupción del tratamiento debe realizarse de manera gradual.

¿Qué hacer si olvida tomar una dosis?

No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada. Si olvida tomar una dosis, tome la siguiente dosis tan pronto como recuerde y luego vuelva a tomar una dosis a la hora habitual. Si es casi la hora de tomar la siguiente dosis (por ejemplo, si la próxima dosis debe ser dentro de 3 horas) omita la dosis olvidada y tome la siguiente dosis en el tiempo normal. Si no está seguro de qué hacer, llame a su médico.

Interacciones

Si toma otros medicamentos informe a su médico, incluidos medicamentos que compra sin receta médica en la farmacia, supermercado o tienda de alimentos saludables. Se han observado interacciones farmacológicas con: rifampicina, carbamazepina, ketoconazol, teofilina, lorazepam, clobazam, diazepam, ácido valproico, fenitoina, fenobarbital, fluoxetina, clopidogrel, entre otros. También interacciona con el alcohol y el tabaco.

Efectos secundarios

Puede experimentar algunos de los siguientes efectos secundarios:

- Somnolencia o fatiga. - Mareos - Cambios en el apetito.

Otros efectos secundarios menos frecuentes:

- Prurito, eritema u otros signos de hipersensibilidad. - Visión borrosa - Alteración del equilibrio
- Diarrea - Pensamientos suicidas - Lesión hepatocelular - Taquicardia - Insomnio - Agitación
- Boca seca - Cambio de coloración en los dientes.

Póngase en contacto con su médico o farmacéutico si tiene mucho sueño o se siente diferente a lo habitual o si presenta cualquier otro efecto secundario.

Sobredosificación:

Si toma demasiado llame inmediatamente a su médico.

Haga esto incluso si no hay signos de incomodidad o envenenamiento.

Condiciones de almacenamiento

Mantener alejado del calor, luz y humedad.
Conservar a una temperatura menor de 30°C